

ՄԻԱՄՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

2020

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

ԹԵՍՏ 1

Խմբի համարը

Նստարանի համարը

Հարգելի դիմորդ

Խորհուրդ ենք տալիս առաջադրանքները կատարել ըստ հերթականության: Ուշադիր կարդացե՛ք յուրաքանչյուր առաջադրանք և պատասխանների առաջարկվող տարբերակները: Եթե Ձեզ չի հաջողվում որևէ առաջադրանքի անմիջապես պատասխանել, ժամանակը խնայելու նպատակով կարող եք այն բաց թողնել և դրան անդրադառնալ ավելի ուշ:

Ձեր առջև դրված թեստ-գրքույկի էջերի դատարկ մասերը ազատորեն կարող եք օգտագործել սևագրության համար: ***Թեստ-գրքույկը չի ստուգվում: Ստուգվում է միայն պատասխանների ձևաթուղթը:***

Առաջադրանքները կատարելուց հետո չմոռանաք պատասխանները ուշադիր և խնամքով նշել պատասխանների ձևաթղթում: Պատասխանների ձևաթղթի ճիշտ լրացումից է կախված Ձեր քննական միավորը:

Մաղթում ենք հաջողություն:

Ա մակարդակ

I. Կատարել առաջադրանքները.

1) Թվի n -ը մասն է նրա 75%-ը:

1) $\frac{1}{4}$

2) $\frac{3}{5}$

3) $\frac{3}{4}$

4) $\frac{4}{5}$

2) Գտնել 15-ից փոքր պարզ թվերի քանակը:

1) 5

2) 6

3) 7

4) 8

3) Գտնել 20-ի զույգ բնական բաժանարարների քանակը:

1) 3

2) 4

3) 5

4) 6

4) Գտնել $\frac{1}{4}$ և $\frac{2}{5}$ թվերի գումարի հակադարձ թիվը:

1) $\frac{20}{13}$

2) $-\frac{13}{20}$

3) $\frac{20}{3}$

4) $-\frac{3}{20}$

II. Գտնել արտահայտության արժեքը.

$\boxed{5} \quad \left(\frac{13}{50}\right)^{-1} + \frac{2}{13}:$

- 1) 4
- 2) 5
- 3) 6
- 4) $\frac{581}{650}$

$\boxed{6} \quad 5^{-\frac{2}{3}} \cdot \sqrt[3]{25}$

- 1) $\frac{1}{5}$
- 2) 1
- 3) 5
- 4) $\sqrt[3]{5}$

$\boxed{7} \quad 1 - 2 \sin^2 22,5^\circ:$

- 1) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- 2) $\frac{1}{2}$
- 3) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- 4) 1

$\boxed{8} \quad \log_{0.2} \frac{1}{125}:$

- 1) 1
- 2) $\frac{1}{2}$
- 3) 3
- 4) 2

III. Կատարել առաջադրանքները.

9

Գտնել $x^2 + 7x - 1 = 0$ հավասարման արմատների գումարը:

- 1) -1
- 2) 7
- 3) -7
- 4) $3,5$

10

Գտնել $\sqrt{3x-5} = 7$ հավասարման արմատը:

- 1) $\frac{5}{3}$
- 2) 18
- 3) -18
- 4) \emptyset

11

Գտնել $7^{4x-10} = 1$ հավասարման արմատը:

- 1) $\frac{11}{4}$
- 2) $-2,5$
- 3) 3
- 4) $2,5$

12

Գտնել $\operatorname{tg}\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$ հավասարման արմատները:

- 1) $-\frac{\pi}{6} + \pi k, k \in Z$
- 2) $\pi k, k \in Z$
- 3) $2\pi k, k \in Z$
- 4) $\frac{\pi}{6} + \pi k, k \in Z$

IV. Կատարել առաջադրանքները.

13 Լուծել $\frac{x+1}{2} \geq 0$ անհավասարումը:

- 1) $[1; +\infty)$
- 2) $(-\infty; -1]$
- 3) $[-1; +\infty)$
- 4) $(-1; +\infty)$

14 Գտնել $x^2 < 20$ անհավասարմանը բավարարող ամբողջ թվերի քանակը:

- 1) 5
- 2) 4
- 3) 9
- 4) 8

15 Լուծել $3^{x-5} > 27$ անհավասարումը:

- 1) $[8; +\infty)$
- 2) $(8; +\infty)$
- 3) $(3; +\infty)$
- 4) $(-\infty; 8)$

16 Լուծել $\log_5(2x-7) \geq 1$ անհավասարումը:

- 1) $(6; +\infty)$
- 2) $(3,5; +\infty)$
- 3) $(12; +\infty)$
- 4) $[6; +\infty)$

V. Առաջին պահեստում կա 240 տ քարածուխ, իսկ երկրորդում՝ 252 տ: Առաջինից օրական բաց թողեցին 16 տ քարածուխ, իսկ երկրորդից՝ 18 տ:

17) 4 օր հետո քանի՞ տոննա քարածուխ կմնա երկու պահեստում միասին:

- 1) 356
- 2) 416
- 3) 312
- 4) 324

18) Երկրորդ պահեստի քարածուխը քանի՞ օր հետո կսպառվի:

- 1) 15
- 2) 14
- 3) 13
- 4) 16

19) Պահեստներում քանի՞ օր հետո կմնա հավասար քանակով քարածուխ:

- 1) 8
- 2) 7
- 3) 6
- 4) 9

20) Քանի՞ տոննա քարածուխ կմնա պահեստներից մեկում այն պահին, երբ մյուս պահեստի քարածուխը սպառվի:

- 1) 18
- 2) 15
- 3) 16
- 4) 17

VI. Տրված են $A(1;2;-1)$, $B(2;3;1)$ և $C(3;1;0)$ կետերը:

21 Տրված կետերից ո՞րն է պատկանում Oxy հարթությանը.

- 1) A
- 2) B
- 3) C
- 4) ոչ մեկը

22 Գտնել \overline{AB} վեկտորի կոորդինատները:

- 1) $\{1;1;2\}$
- 2) $\{-1;-1;-2\}$
- 3) $\{5;2;-2\}$
- 4) $\{6;2;0\}$

23 Գտնել \overline{AB} և \overline{AC} վեկտորների սկալյար արտադրյալը:

- 1) 0
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 6

24 Գտնել \overline{AB} և \overline{AC} վեկտորների կազմած անկյան աստիճանային չափը:

- 1) 30°
- 2) 45°
- 3) 60°
- 4) 90°

VII. Տրված է $f(x) = x^3 - 3x + 6$ ֆունկցիան:

25 Ձ-տնել f ֆունկցիայի ածանցյալը $x=0$ կետում:

- 1) 0
- 2) -1
- 3) -3
- 4) 3

26 Ձ-տնել f ֆունկցիայի կրիտիկական կետերից մեծագույնը:

- 1) 3
- 2) 1
- 3) -1
- 4) 0

27 Ձ-տնել f ֆունկցիայի գրաֆիկի $A(1;4)$ կետում տարված շոշափողի հավասարումը:

- 1) $y = x$
- 2) $y = 0$
- 3) $y = x - 2$
- 4) $y = 4$

28 Ձ-տնել f ֆունկցիայի մեծագույն արժեքը $[0;2]$ միջակայքում:

- 1) -4
- 2) 6
- 3) 8
- 4) 4

VIII. ABC եռանկյան մեջ $AB = 6$, $BC = 8$ և $AC = 6$:

29 Գտնել եռանկյան պարագիծը:

- 1) 20
- 2) 21
- 3) $8\sqrt{5}$
- 4) 10

30 Գտնել եռանկյան մակերեսը:

- 1) 24
- 2) $8\sqrt{5}$
- 3) $6\sqrt{5}$
- 4) $7\sqrt{5}$

31 Գտնել եռանկյան մեծ միջին գծի երկարությունը:

- 1) 4
- 2) 3
- 3) $\sqrt{10}$
- 4) 6

32 Գտնել CD հատվածի երկարությունը, եթե AD -ն ABC եռանկյան A անկյան կիսորդն է:

- 1) $\frac{18}{7}$
- 2) 4
- 3) 3
- 4) $\frac{24}{7}$

IX. Գլանի առանցքային հատույթը $10\sqrt{2}$ անկյունագծով քառակուսի է:

33 Գտնել գլանի առանցքային հատույթի անկյունագծի և հիմքի հարթության կազմած անկյունը:

- 1) 30°
- 2) 45°
- 3) 60°
- 4) 90°

34 Գտնել գլանի հիմքի շառավղի երկարությունը:

- 1) 10
- 2) $10\sqrt{2}$
- 3) $5\sqrt{2}$
- 4) 5

35 Գտնել գլանի կողմնային մակերևույթի մակերեսը:

- 1) 50π
- 2) 100π
- 3) 25
- 4) 10π

36 Գտնել գլանի ծավալը:

- 1) 250π
- 2) 100π
- 3) 100
- 4) $50\pi^2$

X. a, b, c հաջորդականությունը 4 հայտարարով երկրաչափական պրոգրեսիա է, ընդ որում $a+b+c=168$:

37 Քանի՞ անգամ է b -ն մեծ a -ից:

38 Գտնել a -ն:

39 x -ի ի՞նչ արժեքի դեպքում $a, b+x, c$ հաջորդականությունը կլինի թվաբանական պրոգրեսիա:

40 b և c թվերի միջև քանի՞ թիվ պետք է գրել, որպեսզի a, b, \dots, c հաջորդականությունը լինի թվաբանական պրոգրեսիա:

XI. Տրված է $\begin{cases} x^2 - 3x + 2 = 0 \\ 5x - 2 \geq a \end{cases}$ համակարգը, որտեղ a -ն պարամետր է:

41 Գտնել ամենավոքր a ամբողջ թիվը, որի դեպքում համակարգը լուծում չունի:

42 Գտնել բոլոր a ամբողջ թվերի գումարը, որոնց դեպքում համակարգը ունի միակ լուծում:

43 Գտնել ամենամեծ a ամբողջ թիվը, որի դեպքում համակարգն ունի ճիշտ երկու լուծում:

44 Գտնել ամենամեծ a ամբողջ թիվը, որի դեպքում համակարգն ունի լուծում:

XII. Տրված է $f(x) = 8\cos^2 x - 8\sin x \cos x$ ֆունկցիան:

45 ճիշտ են արդյոք հետևյալ պնդումները:

1) $f\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + f(x)$ արտահայտության արժեքը կախված չէ x -ից:

2) $\pi - 1$ թիվը $f(x+1)$ ֆունկցիայի պարբերություն է:

3) Եթե $x \in \left(\frac{\pi}{2}; \frac{5\pi}{4}\right)$, ապա $f(x) > 0$:

4) $\left[-\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$ միջակայքում $f(x)$ ֆունկցիայի գրաֆիկն արագիսների առանցքը հատում է ճիշտ վեց կետում:

5) $f(x)$ ֆունկցիան ներկայացվում է նաև $f(x) = 4\sqrt{3} \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + 4$ տեսքով:

6) $f(x)$ ֆունկցիայի արժեքների տիրույթը պարունակում է ճիշտ 13 ամբողջ թիվ:

Բ մակարդակ

XIII. 200 հա մակերեսով դաշտը վարելու համար 8 օր աշխատեց միևնույն հզորությամբ տրակտորների մի բրիգադ: Այնուհետև նրանց միացավ նույն հզորությամբ մի տրակտոր, որի շնորհիվ բրիգադի արտադրողականությունը մեծացավ 12,5 %-ով, և աշխատելով ևս 4 օր նրանք ավարտեցին աշխատանքը:

46 Աշխատանքի սկզբում քանի՞ տրակտոր էր աշխատում:

47 Մի տրակտորն օրական քանի՞ հեկտար էր վարում:

48 Առաջին երեք օրվա ընթացքում դաշտի ո՞ր տոկոսը վարեց բրիգադը:

49 Առաջին ինը օրվա ընթացքում քանի՞ հեկտար վարեց բրիգադը:

XIV. N -ը և M -ը $ABCD$ զուգահեռագծի համապատասխանաբար CD և BC կողմերի միջնակետերն են, $AN = 6$, $AM = 12$, $\angle NAM = 60^\circ$:

50 Գտնել AMN անկյան աստիճանային չափը:

51 Գտնել BD անկյունագծի երկարության քառակուսին:

52 Գտնել AD -ի երկարությունը:

53 Գտնել AND և NMC եռանկյունների մակերեսների հարաբերությունը:

XV. Գտնել արտահայտության արժեքը.

$$\boxed{54} \quad a^4 + \frac{1}{a^4}, \text{ եթե } a + \frac{1}{a} = 4:$$

$$\boxed{55} \quad \frac{1}{\sqrt{5}-2} + \frac{2}{\sqrt{7}+\sqrt{5}} + \frac{2}{\sqrt{9}+\sqrt{7}}:$$

$$\boxed{56} \quad 16 \cos(2 \operatorname{arctg} \sqrt{15}):$$

$$\boxed{57} \quad \sqrt{8 \lg 4 + \lg^2 25} + \sqrt{8 \lg 25 + \lg^2 4}:$$

XVI. Տրված է $f(x) = \log_3 \sqrt{81-x^2} + \frac{10}{2+|x|}$ ֆունկցիան:

58 Գտնել f ֆունկցիայի որոշման տիրույթին չպատկանող ամենափոքր բնական թիվը:

59 Գտնել f ֆունկցիայի նվազման միջակայքին պատկանող ամբողջ թվերի միջին թվաքանականը:

60 Գտնել f ֆունկցիայի մեծագույն արժեքը:

61 Գտնել այն k ամբողջ թվերի քանակը, որոնց դեպքում $f(k) < f(4)$:

XVII. Կատարել առաջադրանքները.

62

Գտնել 7-ից փոքր թվանշաններով կազմված բոլոր այն քառանիշ թվերի քանակը, որոնցից յուրաքանչյուրի թվանշանները դասավորված են (ձախից աջ) նվազման կարգով:

63

Գտնել 1-ից մեծ թվանշաններով կազմված բոլոր այն եռանիշ թվերի քանակը, որոնցից յուրաքանչյուրում հարևան (կողք-կողքի) թվանշանները տարբեր են:

XVIII. Տրված է $\sqrt{81-x^2} = a - 2|x|$ հավասարումը (a -ն պարամետր է):

64

Ճիշտ են արդյոք հետևյալ պնդումները:

- 1) Հավասարման ԹԱԲ-ը պարունակում է ճիշտ 18 ամբողջ թիվ:

- 2) Գոյություն չունի a -ի այնպիսի արժեք, որի դեպքում հավասարումն ունենա ճիշտ երեք արմատ:

- 3) $a < 9$ պայմանին բավարարող ցանկացած a -ի դեպքում հավասարումն արմատ չունի:

- 4) Գոյություն ունի a -ի միայն երկու ամբողջ արժեք, որոնցից յուրաքանչյուրի դեպքում հավասարումն ունի չորս արմատ:

- 5) $9 < a < 19$ պայմանին բավարարող ցանկացած a -ի դեպքում հավասարումն ունի ճիշտ երկու արմատ:

- 6) Հավասարումն ունի ճիշտ մեկ արմատ a -ի միայն մեկ արժեքի դեպքում:

